

Нарушения слуха у детей



Раннее распознавание нарушений слуха особенно важно для детей, ведь развитие ребенка происходит на основе тех звуков, которые он слышит и пытается воспроизвести.

Слух ребенка закладывается на стадии утробной жизни. Еще в животе матери он слышит и привыкает к приглушенным характерным звукам. Поэтому в младенчестве дети спокойно спят под тихую музыку и могут заплакать от резкого звука. Уже в это время родители должны внимательно следить за реакцией своего малыша на аудиосигналы.

Выявление нарушений слуха у детей

Современный уровень медицины позволяет с помощью компьютерной диагностики определить отсутствие слуха у новорожденного ребенка. Если в возрасте 2-3 месяцев ребенок молчит, т. е. не издает никаких звуков, родители должны немедленно обратиться к специалисту.

Причиной нарушения слуха у детей могут стать:

- наследственность;
- асфиксия новорожденного;
- инфекционные заболевания (корь, отит среднего уха, грипп и др.);
- травмы черепа, удар по голове, по уху.

Если ребенок относится к одной из перечисленных групп риска, следует провести обследование слуха, обратившись к врачу-сурдологу.

Проверка слуха у подростков — обычная процедура в кабинете ЛОР-врача. Отвернувшись, врач произносит слова шепотом с расстояния около 6-метров. Если ребенок слышит фразу, то слух считается нормальным.

При подозрении на нарушение слуха используют более точную диагностику, например аудиометрию. Для этого не требуется вводить в ухо посторонние предметы, делать уколы, поэтому она идеально подходит для детей.

Речевая аудиометрия служит для определения степени восприятия человеческой речи, а тональная — измеряет предел слышимости: определяются самые тихие звуки, воспринимаемые ухом на низких и высоких частотах (диапазон 250–8000 Гц).

Для самых маленьких существуют специальные программы, позволяющие компенсировать нарушение слуха и восстановить речевое развитие. В раннем возрасте до полутора лет формируется система анализа общения с внешним миром на основе полученных слуховых образов. Слуховые аппараты детям можно устанавливать уже в 3-4 месяца, ведь важно не упустить время, т. к. позже приоритетными для мозга ребенка станут органы осязания и зрения.

Лечение проблем со слухом у детей — дело врачей-специалистов. Роль родителей — предупреждение и профилактика заболеваний. В первую очередь, необходимо исключить излишние звуковые нагрузки, травмы ушного канала, ушной раковины. Подрастающим детям важно это объяснить и научить их беречь свой слух.

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru